

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Отрицательный резус-фактор и беременность

Информация о профилактике осложнений во время беременности, когда у матери отрицательный резус-фактор, а у ребёнка — положительный.

При регистрации в акушерском отделении вы сдали анализ крови, который показал, что у вас отрицательный резус-фактор крови, а у вашего ребёнка — положительный. Это означает, что у вашего ребёнка в крови есть резус-фактор, которого у вас нет.

Во время родов небольшое количество крови ребёнка могут попасть в ваши родовые пути. Также подобный риск существует во время беременности. В таком случае ваше тело начнет вырабатывать антитела для борьбы с красными кровяными тельцами ребёнка, это называется резус-иммунизация. Антитела могут проникать через плаценту в кровь ребёнка. При этом они вызывают у ребёнка анемию. Резус-иммунизация у матери и анемия у ребёнка — достаточно редкие явления, но важно принять профилактические меры.

Профилактика резус-иммунизации

Между 25 и 29 неделями беременности вы можете сдать анализ крови, чтобы узнать, нужны ли вам дополнительные проверки во время беременности. В период между неделями 28 и 30 вам сделают инъекцию, чтобы предотвратить активацию иммунной системы и выработку антител. Также вам сделают инъекцию во время родов.

В некоторых случаях кроме этого ребёнку требуется лечение после родов. В первую очередь используется светотерапия. Это простой и безболезненный метод лечения.