

Datum: \_\_\_\_\_ Kl \_\_\_\_\_

Du har fått tablett Mifegyne som förbehandling.

Du kan få en menstruationsliknande blödning, ibland riklig med klumpar.

### **24–48 timmar senare**

Även om du börjat blöda ska du ta Cytotectabletter

**Om du inte blöder:** För in 4 Cytotectabletter djupt i slidan.

**Om du blöder:** Lägg 4 Cytotectabletter under tungan.

Tabletterna ger sammandragningar av livmodern och en blödning, ofta rikligare än en vanlig mens, med inslag av en eller flera klumpar.

**Vid utebliven eller sparsam blödning 3 timmar senare:** Svälj de återstående 2 Cytotectabletterna

Cytotectabletter kan ge feber, frossa och diarré. Dessa biverkningar är ofarliga och går ofta över inom några timmar.

Cytotectabletter kan ge måttlig till intensiv mensvärk, därför rekommenderas smärtlindring enligt nedan.

### **Smärtlindring**

1. Ta 1 g Alvedon och 600 mg Ibuprofen samtidigt som första dosen Cytotectabletter.
2. Ta 5–10 mg Oxynorm vid behov mot svår smärta.
3. Upprepa 1 g Alvedon och 600 mg Ibuprofen vid behov, 6–8 timmar efter första dosen.

### **Efter aborten**

Efter aborten kommer du att ha en avtagande, mensliknande blödning som vanligen pågår i några dagar och upp till 4–5 veckor. Mensen återkommer vanligen 4–6 veckor efter aborten. Observera att du kan bli gravid direkt efter en abort, även om du blöder.

### **Preventivmedel**

Om du har valt spiral får du den insatt vid ett återbesök.

Övriga preventivmedel börjar du med samma dag eller dagen efter senaste Cytotectablett. P-ring kan sättas in när blödningen minskat men senast inom 5 dagar.

### **Kontakta mottagningen om du:**

- inte haft någon blödning en vecka efter Cytotectabletter
- har kvarvarande graviditetskänsla en vecka efter Cytotectabletter.

### **Kontakta gynekuten vid:**


- hög feber, illaluktande blödning/flytning och/eller kraftig smärta efter aborten
- kraftig blödning som inte minskar (mer än 2 fulla bindor per timme i mer än 2 timmar i sträck).

### **Uppföljning**

Datum: \_\_\_\_\_ Kl \_\_\_\_\_

Du kan antingen komma på ett personligt återbesök eller få med ett graviditetstest hem för att användas 2 veckor efter aborten.


## 2 veckor efter Cytotectabletter:




3 droppar urin i ringen

← Läs av testet efter 3 minuter


Vid 2 streck eller inga streck:  
Kontakta din mottagning!



NEGATIVT



POSITIVT



OGILTIGT

—————  
V  
Kontakta din mottagning

**Viktig information till dig som  
gör medicinsk abort hemma**

**Viktiga telefonnummer:**

**OBS: Läs inte av testet 10 minuter eller längre tid efter  
att testet utfördes, då kan felaktiga värden uppstå.**