

Datum: _____ Kl. _____

Du har fått tablett Mifegyne som förbehandling.

Du kan få en menstruationsliknande blödning, ibland riklig med klumpar.

24-48 timmar senare

Även om du börjat blöda ska du ta Cytotectabletter

Om du inte blöder: För in 4 Cytotectabletter djupt i slidan.

Om du blöder: Lägg 4 Cytotectabletter under tungan.

Tabletterna ger sammandragningar av livmodern och en blödning, ofta

rikligare än en vanlig mens, med inslag av en eller flera klumpar.

Vid utebliven eller sparsam blödning 3 timmar senare: Svälj de

återstående 2 Cytotectabletterna

Cytotectabletter kan ge feber, frossa och diarré. Dessa biverkningar är

ofarliga och går ofta över inom några timmar.

rekommenderas smärtt lindring enligt nedan.

Smärtt lindring

1. Ta 1 g Alvedon och 600 mg Ibuprofen samtidigt som första dosen

Cytotectabletter.

2. Ta 5-10 mg Oxynorm vid behov mot svår smärta.

3. Upprepa 1 g Alvedon och 600 mg Ibuprofen vid behov, 6-8 timmar efter

första dosen.

Efter aborten

Efter aborten kommer du att ha en avtagande, mensliknande blödning

som vanligen pågår i några dagar och upp till 4-5 veckor. Mensen

återkommer vanligen 4-6 veckor efter aborten. Observera att du kan bli

gravid direkt efter en abort, även om du blöder.

Preventivmedel

Om du har valt spiral får du den insatt vid ett återbesök.

Övriga preventivmedel börjar du med samma dag eller dagen efter

senaste Cytotectablett. P-ring kan sättas in när blödningen minskat men

senast inom 5 dagar.

Kontakta mottagningen om du:

- inte haft någon blödning en vecka efter Cytotectabletter

- har kvarvarande graviditetstestskänsla en vecka efter

Cytotectabletter.

Kontakta gynakuten vid:

- hög feber, illaluktande blödning/flytning och/eller kraftig smärta

efter aborten

- kraftig blödning som inte minskar (mer än 2 fulla bindor per

timme i mer än 2 timmar i sträck).


Uppföljning

Datum: _____ Kl. _____

Du kan antingen komma på ett personligt återbesök eller få med ett

graviditetstest hem för att användas 2 veckor efter aborten.


2 veckor efter Cytotectabletter:




3 droppar urin i ringen

← Läs av testet efter 3 minuter


Vid 2 streck eller inga streck:
Kontakta din mottagning!



NEGATIVT



POSITIVT



OGILTIGT

—————
V
Kontakta din mottagning

**Viktig information till dig som
gör medicinsk abort hemma**

Viktiga telefonnummer:

**OBS: Läs inte av testet 10 minuter eller längre tid efter
att testet utfördes, då kan felaktiga värden uppstå.**