

Biverkningar vid antipsykotisk läkemedelsbehandling

Läkemedel	Extrapyramidala biv/tardiv dyskinesi (Dopamin-D2 receptor-blockad)	Prolaktin stegring (Dopamin-receptor-blockad)	Viktuppgång Histamin H1 (Serotonin 5-HT _{2C} Receptor-blockad)	Nedsatt glukos-tolerans Förhöjda lipider	Förlängning av QT- intervall	Sedation (Histamin H1-receptor-blockad)	Hypotension (Adrenerg α_1 receptor-blockad)	Antikolinerga biverkningar (Muskarin-receptor-blockad)
Perfenazin	++	++	+	+	(+)	+	+	(+)
Haloperidol	+++	+++	+	(+)	+	++ ^c	++	0
Klozapin ^a	0	0	+++	+++	(+)	+++	+++	+++
Risperidon	+	+++	++	+	(+)	+	++	0
Olanzapin	0	+	+++	+++	0	++	+	++
Quetiapin ^b	0	0	++	++	0	++	++	++
Ziprasidon	0	+	0	0-	++	0	0	0
Aripiprazol	+ ^d	0	0	0	0	0	0	0
Paliperidon	+	+++	+(+)	+	(+)	+	++	0
Zuklopentixol	+++	+++	++	(+)	+	++	++	+
Lurasidon	+	+	0	0	+	+	0	0

0 = inga biverkningar

++ = Ibland biverkningar vid terapeutiska doser

+++ = ofta biverkningar vid terapeutiska doser

[Janusinfo - Algoritm för bedömning av hyperprolaktinemi vid behandling med antipsykotiska läkemedel](#)

[Kloka listan - Psykos](#)