

Föräldrainformation om vaccination mot tuberkulos

Tuberkulos är en sjukdom som finns i hela världen. Sjukdomen kan vara svår för små barn och personer med svagt skydd mot infektioner. Tuberkulos drabbar oftast lungorna men kan också sätta sig på andra delar av kroppen, tex. skelett eller hjärna.

Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige. Vaccinet erbjuds därför endast till barn med ökad risk att smittas av tuberkulos.

Hur går vaccinationen till?

Vaccinet (BCG) sprutas in i huden på övre delen av vänster överarm. Direkt efter vaccination ses en liten upphöjning i huden som snabbt försvinner.

Biverkningar?

De flesta barn som vaccineras med tuberkulosvaccin får ett märke (ärr) på platsen för vaccination. I ovanliga fall kan det bli ett större sår som tar längre tid att läka.



Vad händer efter vaccination?

Efter ca 2-4 veckor får de flesta barn en liten röd upphöjning på armen där vaccinet givits. Efter 6-8v blir det ofta ett litet sår. Det kan rinna vätska från såret. Såret läker hos de flesta inom 3-4 månader och det kan bli ett märke (ärr). Om såret rinner kan du använda en torr kompress som skydd (använd inte plåster). Undvik bassängbad. Undvik att pressa ut var.

När ska du kontakta din sjuksköterska på BVC?

Om det blir en rodnad, svullnad eller blåsor inom några dagar efter vaccinationen.
Om det blir ett större sår än på bilden nedan.
Om ditt barn inte vill använda armen.
Om du har övriga frågor kring vaccinreaktionen.