

Forskning på gång i Region Stockholm

Aktuellt för BMM			
Studie, länk & kontakt	Ämne/metod	Mål/Syfte	Deltagande
MOM2B Mom2B: Forskningsstudie och gravidapp Mom2b - Nu satsar vi på mammorna! mom2b@kbh.uu.se	Förlossningsdepression och för tidig födsel.	Att studera om man kan använda data som samlas in med en mobilapp för att identifiera kvinnor med hög risk att drabbas av psykisk eller fysisk sjuklighet under graviditet och förlossning.	Gravid eller har fött barn för mindre än tre månader sedan. Använder smartphone. Minst 18 år gammal.
FNAIT (Fetal Neonatal Alloimmun Trombocytopeni) eva.wiberg-itzel@regionstockholm.se	Förekomst av HPA-1a alloimmunisering hos kvinnor med en identifierat högre risk för FNAIT. Blodprover samt besök.	Bedöma risk för FNAIT, ett sällsynt tillstånd som påverkar barns trombocyter och utsätter det för risk för problem med blödningar, särskilt i hjärnan.	Gravid i vecka 10 till 14.
DANA Välkommen till DANA-studien! - DANA-projektet (ki.se) sandra.froojd@ki.se	Internetbehandling för gravida med depression.	Att undersöka internetbehandling för depression under graviditeten.	Gravid i vecka 8-30 då behandlingen startar, inskriven och regelbundet går till MVC. Har en depressionsdiagnos (bedöms innan behandlingens start). Är minst 18 år. Har tid att engagera dig i ditt behandlingsarbete ca 10 veckor. Har tillgång till dator och internet. Har möjlighet att göra praktiska övningar i din vardag.
FMM (Föräldraskap med Medvetenhet och Medkänsla) FMM - Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) - Uppsala universitet (uu.se) gunilla.lonnberg@pubcare.uu.se	Föräldraskapsstöd till gravida och blivande pappor/medmammor. Gruppträffar och ett digitalt material. Även fortbildning för barnmorskor för att leda gruppträffarna.	Att förstärka föräldraskapsstödet i det allra tidigaste skedet, eftersom tiden under graviditeten och efter förlossningen innebär både en ökad risk för psykisk ohälsa och en unik möjlighet att främja psykisk hälsa hos både föräldrar och barn.	Fas 1 utveckling, fas 2 pilot-RCT, Fas 3 fullskalig RCT.

Studie, länk & kontakt	Ämne/metod	Mål/Syfte	Deltagande
<p>Infektioner hos migranter – betydelsen av malaria och andra parasiter.</p> <p>miranda.wiren@stud.ki.se</p> <p>Studietelefon 08-524 814 37</p>	<p>Infektioner hos migranter. Enkät och blodprovstagning vid ett tillfälle.</p>	<p>Undersöka förekomsten av malaria och andra parasiter hos gravida som är födda i länder där det finns malaria.</p>	<p>Gravid eller nyförlöst kvinna född och uppvuxen i ett land i sub-Sahariska Afrika.</p>
<p>IMPROVE-it</p> <p>https://ki.se/en/gph/improve-it</p> <p>elin.jarsson@ki.se</p>	<p>Implementing best practice postpartum contraceptive services through a quality improvement initiative for the target group, immigrant women, in Sweden.</p>	<p>Fokusgrupper och kluster-RCT.</p>	<p>BMM i Stockholm & Jönköping.</p>
<p>Våld i nära relationer.</p> <p>Viktigt forskningsprojekt i primärvården för att upptäcka våldsutsatta (akademisktprimarvardscentrum.se)</p> <p>mia.barimani@regionstockholm.se</p>	<p>Våld i nära relationer. Utvärdera standardiserat formulär och träning med virtuella patienter.</p>	<p>Undersöka om ett nytt arbetssätt leder till att personal upptäcker fler patienter som är utsatta för våld i nära relationer.</p>	<p>6 BMM, 6 Vårdcentraler, 6 Ungdomsmottagningar.</p>
<p>Pappastudien-erfarenheter från pappor med IF</p> <p>tommie.forslund@regionuppsala.se</p> <p>Telefon: 018 – 617 38 55</p> <p>eva.randell@uu.se</p>	<p>Pappor med intellektuell funktionsnedsättning – deras syn på föräldrarollen, faktorer som försvårar och underlättar föräldraskap, samt stöd i föräldraskapet</p>	<p>Undersöka hur pappor med IF uppfattar sin föräldraroll, faktorer som försvårar och underlättar föräldraskap, samt stöd i föräldraskapet</p>	<p>Söker pappor som:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Har en konstaterad lindrig intellektuell funktionsnedsättning 2. Har hemmaboende (åtminstone halvtid) barn, oavsett barns ålder 3. Talar tillräckligt god svenska för att kunna delta i en intervju
<p>Hjärnan efter förlossning</p> <p>https://hormonesandbrain.com/peripartum-brain-studie/</p> <p>peripartumbrain@gmail.com</p>	<p>Magnetkameraundersökning av hjärnan cirka två månader efter förlossning</p>	<p>Att kartlägga vad som händer i hjärnan efter en graviditet, och hur förändringar i hjärnan relaterar till vanliga humörssymtom som sänkt sinnesstämning efter förlossning</p>	<p>Frisk, normal graviditet Möjlighet att komma till Akademiska sjukhuset i Uppsala 8-12 veckor efter förlossning (reseersättning) Förstår muntlig och skriftlig information på svenska.</p>
<p>MAMP studien (Medication Adherence Measurement in Pregnancy)</p> <p>Vill du vara med i en enkätstudie om behandling med antidepressiva eller astmaläkemedel vid graviditet ? - Janusinfo.se</p> <p>University of Oslo & Janusinfo</p> <p>ulrika.norby@regionstockholm.se</p> <p>tfn. 070 00 218 88</p>	<p>Elektronisk enkät</p>	<p>Upplevelse av behandlingen och hur personen har tagit/tar dina läkemedel i syfte att utvärdera ett nytt verktyg för att bedöma hur gravida kvinnor följer sin läkemedelsbehandling.</p> <p>Mål: att bättre kunna stötta framtida gravida kvinnor som behöver behandling med de här läkemedelsgrupperna.</p>	<p>Använder eller har använt antidepressiva läkemedel eller läkemedel vid astma – antingen under graviditeten eller året innan graviditet</p>

Studie, länk & kontakt	Ämne/metod	Mål/Syfte	Deltagande
<p>Svampstudien (2 studier ingår)</p> <p>svampstudien@meds.ki.se (för båda studierna)</p> <p>Forskningsbarnmorska studie 1: Tel. 08-123 570 22 elisabeth.storch@regionstockholm.se</p>	<p>Candidainfektioner</p> <p>Studie 1) recidiverande Candidainfektioner (RCT)</p> <p>Studie 2) akut skov av Candida infektion (Molekylära mekanismer vid vulvovaginal candidainfektion) gynus samt provtagning</p>	<p>1. Studera effekt samt resistensutveckling genom behandling med vaginalt klorhexidin (Hibitane®) eller traditionell behandling med Flukonazol.</p> <p>2. kartlägga bakomliggande funktioner i slidans slemhinna vid svampinfektion för att kunna utveckla bättre behandlingsmetoder.</p>	<p>Studie 1) Frisk, 18–50 år, har anamnes på >2 Candida infektioner senaste året, symtom på akut Candida infektion, har adekvat preventivmetod, förstår svenska, inte vara gravid eller amma, inte ha någon pågående behandling med antibiotika eller annan medicinering som påverkar immunförsvaret</p> <p>Studie 2) Frisk, 18-40 år, inga aktuella gynekologiska besvär förutom symtom på svampinfektion, inte vara gravid</p>
Aktuellt på förlossning/BB			
Studie, länk & kontakt	Ämne	Mål/Syfte	Deltagande
<p>OPTION</p> <p>https://www.optionstudien.se/</p> <p>Se kontaktuppgifter för respektive sjukhus</p>	<p>Heminduktioner.</p>	<p>Att undersöka den födandes, partners och medarbetares upplevelse av heminduktion samt hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser av att kunna påbörja sitt förlossningsarbete i hemmet.</p>	<p>Frisk, normal graviditet.</p>
<p>SAVE</p> <p>Hem SAVE-studien (savestudien.se)</p> <p>info@savestudien.se</p>	<p>Stödinsatser med intakt navelsträng nära mamma.</p>	<p>Undersöka om barnet återhämtar sig bättre om barnmorskan låter bli att klippa navelsträngen och att samma personer i stället hjälper barnet nära mamman.</p>	<p>Nationellt med flera kliniker.</p>
<p>PICRINO</p> <p>picrino.se En förlossningsstudie</p> <p>picrino@regionostergotland.se</p>	<p>Förändrar sättet att arbeta i förlossningsvården genom att införa nya riktlinjer kring bland annat förlossningsprogress och ett nytt partogram kallat Labour Care Guide.</p>	<p>Undersöka om nya riktlinjer för förlossningsprogress och stöd under förlossningen kan minska risken för svår sjukdom och död hos det nyfödda barnet och minska interventioner under förlossningen samt förbättra förlossningsupplevelsen.</p>	<p>24 kliniker, nationell studie.</p>

Övrigt			
Studie, länk & kontakt	Ämne	Mål/Syfte	Deltagande
INTRAM INTRAM-studien Karolinska Institutet (ki.se) helena.kopp-kallner@ki.se	Optimal tidpunkt för insättning av en spiral efter en medicinsk abort.	Undersöka om spiralinsättning inom 48 timmar efter en medicinsk abort kan vara bättre än rutinmässig insättning vid ett återbesök efter två till fyra veckor.	Frisk kvinna ≥ 18 år, som ska genomgå en medicinsk abort och som valt spiral som efterföljande preventivmedel kan efter muntlig och skriftlig information välja att delta.